

ALCOMAN®

Aldehyd- und phenolfreie Händedesinfektion

- ✓ Wirkungsgrad von 99,999 %
- ✓ VAH - zertifiziert
- ✓ wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid
- ✓ biologisch gut abbaubar
- ✓ farblos
- ✓ begrenzt viruzid und ist damit umfassend wirksam gegen alle behüllten Viren (BVDV/Vaccinia inkl. HBV, HIV, HCV)
- ✓ wirksam gegen unbehüllte Viren (Rota- und Noroviren)
- ✓ wirksam gegen Bakterien (MRSA)
- ✓ Zugelassen in der BRD: Zul.-Nr. 1599.98.99 (Arzneimittel)
- ✓ Einwirkzeit: 30 Sekunden



HÄNDEDESINFEKTION

REF	Artikel	Karton	Europalette
01007D	150 ml Flasche	24 x 150 ml	140 Karton
00978D	500 ml Flasche	18 x 500 ml	60 Karton
00983D	1 l Flasche	10 x 1 l	48 Karton
00984 D	5 l Kanister	2 x 5 l	52 Karton

Zubehör:

REF	Artikel
00929	Dosierpumpe 500 ml
00930	Dosierpumpe 1 l
00931	Kanisterdosierpumpe 5 l
00932	Kanisterschlüssel 5 l
00996	Kanisterhahn 5 l

ALCOMAN[®]

Zusammensetzung:

In 100 g sind enthalten: 2-Propanol 63,1 g; gereinigtes Wasser 36,9 g

Vorsichtsmaßnahmen / Warnhinweise:

Nur äußerlich anwenden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Leicht entzündlich. Behälter dicht verschlossen halten. Nicht in die Augen bringen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen.

Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes, sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden!

Anwendung:

Zum Auftragen auf die Haut.

Dosierung:

Zur hygienischen Händedesinfektion 3-5 ml ALCOMAN[®] in den Händen verreiben.

Auf vollständige Benetzung achten.

Hygienische Händedesinfektion:

Gemäß EN 1500 15 Sek.

DGHM / VAH-Liste 15 Sek.

Chirurgische Händedesinfektion:

DGHM / VAH-Liste 5 Min.

Wirksam gegen **alle behüllten Viren**, z.B. BVDV/ Vaccinia inkl. HBV, HIV, HCV: 15 Sek.

und **unbehüllte Viren**, z.B. Rotavirus: 30 Sek., Norovirus: 30 Sek.

Gegenanzeigen:

ALCOMAN[®] ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden.

Nebenwirkungen:

Bei Anwendung von ALCOMAN[®] können Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten.

Hinweis:

Wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.